


Таблиця 1. Ускладнення попередніх вагітностей та/або теперішньої вагітності, які супроводжуються підвищеним ризиком перинатальної захворюваності/смертності та потребують ретельного моніторингу за станом плода (*Товариство Акушерів-Гінекологів Канади, 2007*)

Акушерський анамнез
<p>Материнські ускладнення</p> <ul style="list-style-type: none"> • Гіпертензивні розлади • Передчасне відшарування плаценти
<p>Плодові ускладнення</p> <ul style="list-style-type: none"> • Затримка внутрішньоутробного росту • Мертвонародження
Теперішня вагітність
<p>Материнські ускладнення</p> <ul style="list-style-type: none"> • Переношена вагітність (294 дні, 42 тижні) • Гіпертензивні розлади • Цукровий діабет • Гестаційний діабет • Передчасний розрив плодових оболонок • Ізо-імунізація • Патологічні результати біохімічного скринінгу (hCG, AFP) за відсутності підтверджених структурних аномалій • Вагінальна кровотеча • Ожиріння • Вік матері більше 35 років • Вагітність в наслідок ДРТ
<p>Плодові ускладнення</p> <ul style="list-style-type: none"> • Зниження рухової активності плода • Затримка внутрішньоутробного росту • Маловоддя/багатоводдя • Багатоплодова вагітність • Загроза передчасних пологів

Алгоритм оцінки стану плода



Програма "Здоров'я матері та дитини" Швейцарія - Україна



ОЖ – окружність живота, ПМП – передбачувана маса плода, ДАП – доплерометрія кровоплину в артеріях пуповини, КДК – кінцевий діастолічний кровоплин, ІР – індекс резистентності, ОАР – об'єм амніотичної рідини, БПП – біофізичний профіль плода



* - БПП наданий в балах за шкалою Маннінга (Manning F)

Значення перцентилів передбачуваної маси плода за формулою Hadlock

Тиждень вагітності						
(за останньою	3	10	50	90	97	
10	26	29	35	41	44	
11	34	37	45	53	56	
12	43	48	58	68	73	
13	55	61	73	85	91	
14	70	77	93	109	116	
15	88	97	117	137	146	
16	110	121	146	171	183	
17	136	150	181	212	226	
18	167	185	223	261	279	
19	205	227	273	319	341	
20	248	275	331	387	414	
21	299	331	399	467	499	
22	359	398	478	559	598	
23	426	471	568	665	710	
24	503	556	670	784	838	
25	589	652	785	918	981	
26	685	758	913	1,068	1,141	
27	791	876	1,055	1,234	1,319	
28	908	1,004	1,210	1,416	1,513	
29	1,034	1,145	1,379	1,613	1,724	
30	1,169	1,294	1,559	1,824	1,649	
31	1,313	1,453	1,751	2,049	2,189	
32	1,465	1,621	1,953	2,285	2,441	
33	1,622	1,794	2,162	2,530	2,703	
34	1,783	1,973	2,377	2,781	2,971	
35	1,946	2,154	2,595	3,036	3,244	
36	2,110	2,335	2,813	3,291	3,516	
37	2,271	2,513	3,028	3,543	3,785	
38	2,427	2,686	3,236	3,786	4,045	
39	2,576	2,851	3,435	4,019	4,294	
40	2,714	3,004	3,619	4,234	4,524	

Джерело:
HADLOCK, F. P.; HARRIST, R. B. & MARTINEZ-POYER, J.,
In utero analysis of fetal growth: A sonographic weight standard.
Radiology, 1991.181:129-133.

Значення перцентилів передбачуваної маси плода при двійні за Blickstein

Термін вагітності (тиж.)	10-а перцентиль	50-а перцентиль
28	780	1134
29	907	1276
30	1029	1474
31	1200	1644
32	1332	1795
33	1516	1985
34	1673	2155
35	1871	2353
36	2020	2515
37	2155	2665
38	2266	2778
39	2268	2835
40	2183	2807

Джерело:
 Isaac Blickstein, Louis G. Keith. Neonatal mortality rates among growth-discordant twins, classified according to the birth weight of the smaller twin.
 American Journal of Obstetrics and Gynecology (2004) 190, 170